

CENTER FOR PEDIATRIC ORTHOPAEDICS & SCOLIOSIS

1432 SOUTH DOBSON SUITE 304 MESA, AZ 85202

(480) 512-7400 FAX- (480) 512-5991

www.pedsorthopaedics.com

ROBERT P HUANG, MD

PEDIATRIC SPINE SURGERY

PEDIATRIC ORTHOPAEDIC SURGERY

RANDALL SORRENTINO, PA-C

PEDIATRIC SPINE SURGERY

PEDIATRIC ORTHOPAEDIC SURGEY

LISA DOBSON, RN

PEDIATRIC ORTHOPAEDICS CASE MANAGER

SCOLIOSIS CASE MANAGER

Instrucciones Del Yeso

El yeso es usado para inmovilizar, soporte, proteger o corregir alguna parte del cuerpo.

Secando el yeso: El yeso toma 24 - 48 horas para secarse. Hasta que el yeso este seco mantengalo descubierto para que le entre aire en toda parte del yeso.

Cuidado del yeso:

1. Mantenga el yeso seco.
2. Revise la piel alrededor del yeso. No use aceites o cremas alrededor, puede causarle llagas.
3. Tenga cuidado con cosas pequenas (como comida, prendedores, monedas) que se le puedan meter en el yeso, puede causarle llagas. Una mangera de su aspiradora puede servir para remover articulos pequenos que se hayan metido. No permita que su niño/niña use objetos siguientes: palos ganchos ext. Si tiene comeson esto puede causarle raspones o llagas o una infeccion.
4. Revise el movimiento: si su niño/niña tiene el yeso en el brazo que mueva los dedos, si el yeso esta en la pierna que mueva los dedos de los pies.
5. Revise la sensacion: si su niño/niña no distingue cual dedo le ha tentado, mencionelo al medico. Si el niño/niña es muy pequeno apriete el dedo se el niño siente la sensacion, el retirara su mano o pie.
6. Revise el color: compare con la otra mano o pie. Si esta palido morado, o muy rojo quiere decir que hay algun problema, consulte con el medico.
7. Revise la inflamacion: si ocurre, eleve lo que esta en yesado, sea el pie o la mano, eleve mas arriba del nivel del corazon por unas cuantas horas.
8. Para infantes o niños pequenos con el yeso en el pie cuentele los dedos, si por alguna causa los dedos desaparensen esto quiere decir que el yeso se esta reblando y es necesario cambiarse.